



Tamaño real

EMPEZAR A USAR AFREZZA®

LA ÚNICA INSULINA INHALADA DE ACCIÓN ULTRARRÁPIDA
PARA ADULTOS CON DIABETES TIPO 1 O TIPO 2



Indicaciones y limitaciones de uso

Afrezza® (insulin human) Inhalation Powder es una insulina humana de acción rápida que se aspira a través de los pulmones (se inhala) y se usa para controlar los niveles altos de azúcar en sangre en pacientes adultos con diabetes mellitus. AFREZZA está disponible únicamente con receta médica.

- AFREZZA no debe usarse en lugar de la insulina de acción prolongada. AFREZZA debe usarse con la insulina de acción prolongada en personas que tienen diabetes tipo 1.
- AFREZZA no se usa para tratar la cetoacidosis diabética.
- Se desconoce si AFREZZA es segura y eficaz para ser usada en personas que fuman. AFREZZA no se debe usar en personas que fuman o que han dejado de fumar recientemente (menos de 6 meses).
- Se desconoce si AFREZZA es segura y eficaz en niños menores de 18 años.

AFREZZA puede provocar efectos secundarios graves, incluyendo problemas pulmonares repentinos (broncoespasmos). No use AFREZZA si tiene problemas pulmonares de larga duración (crónicos), como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Antes de comenzar a usar AFREZZA, su proveedor de atención médica le hará una prueba de respiración para verificar cómo están funcionando sus pulmones.

Consulte la Información de seguridad importante adicional de Afrezza en la página 12 o en www.afrezza.com. La [Guía del medicamento](#) y las [Instrucciones de uso](#) completas se pueden encontrar en www.afrezza.com.

TOMANDO EL CONTROL CON AFREZZA®

Como alguien que vive con diabetes tipo 1 o tipo 2 y depende de la insulina a la hora de las comidas, usted sabe lo importante que puede ser la flexibilidad. Afrezza es la única insulina inhalada de acción ultrarrápida que trabaja en su horario para proporcionar control en el momento a la hora de las comidas.



SIN PLANIFICACIÓN

Afrezza® le permite inhalar su insulina justo cuando llega la comida, incluso de forma inesperada, para que pueda ser espontáneo pero estar aún en control.



SIN ESPERA

Afrezza® reduce su azúcar en la sangre rápidamente*, de manera similar a la respuesta natural del cuerpo con la insulina.



SIN INYECCIONES

Afrezza® disminuye su nivel de azúcar en la sangre sin necesidad de inyecciones a la hora de las comidas.

*Empieza a bajar el azúcar en la sangre en alrededor de 12 minutos.



¿QUÉ ES AFREZZA®?

Un tratamiento con insulina a la hora de las comidas mediante un innovador método de administración por inhalación.

HORA DE LAS COMIDAS A SU TIEMPO

- Insulina inhalada que llega al torrente sanguíneo en menos de 1 minuto.
- Empieza a bajar el azúcar en la sangre en unos 12 minutos.

CONTROL CON EL QUE PUEDE CONTAR

- Elimina más de 1000 inyecciones a la hora de las comidas al año.*
- Control comprobado a la hora de las comidas en estudios de más de 3000 personas que viven con diabetes tipo 1 o tipo 2.

Dado que Afrezza se elimina del organismo rápidamente en un lapso de 1.5 a 3 horas,[†] dependiendo de la dosis, le da la opción de tomar dosis adicionales 1 y 2 horas después de las comidas, si es necesario.

*Suponiendo que se usa 1 aguja por comida, 3 comidas por día durante 365 días, redondeado hacia abajo.

[†]Para los cartuchos de 4 y 12 unidades, respectivamente.



LLENANDO SU RECETA

Aquí hay una guía paso a paso para llenar su primera receta de Afrezza®:

1. Antes de ir a la farmacia, asegúrese de **descargar** su tarjeta de ahorros Afrezza en **www.AfrezzaSavingsCard.com**.
2. Lleve tanto su receta como su tarjeta de ahorros a la farmacia, y es posible que deba darles al menos 48 horas para completar su pedido ya que algunos lugares podrían necesitar que se les envíe Afrezza.

PAY AS LITTLE AS \$35 PER PRESCRIPTION FILL

SEE TERMS OF USE AT: WWW.AFREZZASAVINGS CARD.COM

MAXIMUM BENEFIT LIMITATIONS APPLY. MANHIND CORPORATION RESERVES THE RIGHT TO REScind, REVOKE, OR AMEND THIS OFFER WITHOUT NOTICE. PLEASE SEE COMPLETE PROGRAM TERMS AND CONDITIONS FOR MORE INFORMATION. FOR QUESTIONS, PLEASE CONTACT (833) 423-4843.

afrezza (insulin human) Inhalation Powder

Presented by **Change Healthcare**

RxBIN: 004682
RxPCN: CN
RxGRP: EC38301001
ID: 0000000000

PLEASE SEE FULL PRESCRIBING INFORMATION, INCLUDING BOXED WARNING, MEDICATION GUIDE, AND INSTRUCTIONS FOR USE FOR AFREZZA ON WWW.AFREZZA.COM

AFREZZA and the Afrezza logo are registered marks, all owned by MannKind Corporation © MannKind Corporation 2022, US-AFZ-2581

CONTROLE SUS COSTOS CON LA TARJETA DE AHORROS AFREZZA*

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE

Comuníquese con **AfrezzaAssist®** para cualquier problema relacionado con su receta de Afrezza.

Nuestras Guías de apoyo al paciente pueden ayudarle a explorar opciones para obtener apoyo si su plan de salud o el farmacéutico le informan que Afrezza no está cubierta en su plan actual.

AfrezzaAssist®: 1-844-323-7399

*Aplican criterios de elegibilidad y limitaciones de beneficios máximos. Ingrese a www.AfrezzaSavingsCard.com para obtener los detalles completos.

CÓMO TOMAR AFREZZA®

Con estos sencillos pasos, aprenda a controlar sus niveles de glucosa a la hora de comer.




ADMINISTRACIÓN EFICAZ

Como todos los tratamientos con insulina, evalúe el efecto que Afrezza tiene en usted y comuníquese con su médico si siente que necesita cambiar su dosis.



ADMINISTRACIÓN TÍPICA A LA HORA DE LAS COMIDAS

En los ensayos clínicos, la mayoría de los pacientes recibieron 12-24 unidades de insulina Afrezza por comida al final del estudio.



ASPECTOS DE LA CONVERSIÓN

Según los ensayos clínicos, para lograr un efecto hipoglucemiante comparable al de la insulina inyectable se pueden requerir aproximadamente 1.5 veces la cantidad de Afrezza. Puede que necesite ajustar su dosis, aumentarla o reducirla, en función de sus niveles de azúcar en la sangre y de cómo actúa Afrezza en usted.

Controle con frecuencia sus niveles de glucosa en sangre para ver cómo le está funcionando Afrezza.

CÓMO TOMAR AFREZZA®

Con estos sencillos pasos, aprenda a controlar sus niveles de glucosa a la hora de comer.



DOSIFICACIÓN CON CARTUCHOS

Si ha tenido experiencia con inyecciones a la hora de las comidas, utilice esta tabla de conversión de la dosis inicial para ayudarle a determinar la cantidad correcta de unidades de insulina Afrezza que necesita. En pacientes que no han recibido insulina, empezar con 4 unidades en cada comida.

DOSIS DE INSULINA INYECTADA A LA HORA DE LAS COMIDAS	DOSIS INICIAL DE AFREZZA	# DE CARTUCHOS NECESARIOS		
		4 UNIDADES AZUL	8 UNIDADES VERDE	12 UNIDADES AMARILLO
HASTA 4 UNIDADES	4 UNIDADES			
5-8 UNIDADES	8 UNIDADES			
9-12 UNIDADES	12 UNIDADES	 +  ○ 		
13-16 UNIDADES	16 UNIDADES			
17-20 UNIDADES	20 UNIDADES	 + 		
21-24 UNIDADES	24 UNIDADES			

CÓMO TOMAR AFREZZA®

Con estos sencillos pasos, aprenda a controlar sus niveles de glucosa a la hora de comer.



HACIENDO AJUSTES PARA MAXIMIZAR LOS RESULTADOS

Al comenzar su nuevo tratamiento, asegúrese de medir sus niveles de glucosa en la sangre con frecuencia para hacer un seguimiento de cómo le está funcionando Afrezza. Converse sobre los resultados con su proveedor de atención médica para que puedan trabajar juntos, con el fin de ajustar la dosis de Afrezza de modo que funcione para usted.

DOSIFICACIÓN DE AFREZZA® POR COMIDA

Trabaje con su médico para determinar el régimen de dosificación adecuado para usted, luego apúntelo aquí:

PASO 1: Tome la dosis prescrita de Afrezza.

DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	BOCADILLO
_____ Unidades	_____ Unidades	_____ Unidades	_____ Unidades

PASO 2: Revise el nivel de azúcar en la sangre para saber cómo le está funcionando Afrezza.

_____ hora(s) después de comenzar la comida*

PASO 3: Dosis de seguimiento, si es necesaria.

AZÚCAR EN SANGRE DESPUÉS DE LA COMIDA	DOSIS DE SEGUIMIENTO
Meta de azúcar en sangre: entre _____ mg/dl y _____ mg/dl	No necesita dosis de seguimiento
Más de _____ mg/dl	Tome _____ unidades

PASO 4: Ajuste la dosis, si es necesario.

- Si su nivel de azúcar en la sangre después de las comidas permanece por encima de su rango meta de azúcar en la sangre durante _____ días, consulte a su médico para considerar aumentar su dosis en el paso 1.
- Continúe ajustando la dosis hasta que su nivel de azúcar en la sangre después de las comidas esté constantemente dentro de su rango meta.
- Si su nivel de azúcar en la sangre después de las comidas es más bajo que su rango meta, consulte a su médico.

Desde cambios en la dieta y el ejercicio hasta niveles de estrés y medicamentos, la vida cambia constantemente. Afortunadamente, Afrezza se puede adaptar para cambiar con ella, con una variedad de tamaños de cartucho (cartuchos de 4, 8 y 12 unidades) para ayudar a manejar los ajustes necesarios.

*La Asociación Americana de Diabetes sugiere 1-2 horas después del comienzo de la comida. La Asociación Estadounidense de Endocrinología Clínica sugiere 2 horas después del comienzo de la comida.

CÓMO USAR AFREZZA®



UNA GUÍA PASO A PASO PARA SU PRIMERA DOSIS

Antes de tomar su primera dosis, asegúrese de aprender las técnicas de inhalación adecuadas y cómo funciona Afrezza. Puede preguntar sobre las instrucciones y recibir capacitación adicional comunicándose con AfrezzaAssist®.

Llame al **1-844-323-7399** para hablar con uno de nuestros Guías de apoyo al paciente. Vea el video "Cómo usar Afrezza" en **www.Afrezza.com**.

PASO 1: SELECCIONE EL CARTUCHO PARA SU DOSIS



4 UNIDADES:

Si su dosis de Afrezza es 4 unidades, use 1 cartucho azul.



8 UNIDADES:

Si su dosis de Afrezza es 8 unidades, use 1 cartucho verde.







12 UNIDADES:

Si su dosis de Afrezza es 12 unidades, use 1 cartucho amarillo.

Si la dosis de Afrezza que le recetaron es superior a 12 unidades, deberá utilizar más de 1 cartucho para obtener la dosis correcta.

PASO 2: CARGUE UN CARTUCHO

- **SOSTENGA EL INHALADOR:** sostenga el inhalador nivelado en una mano con la boquilla blanca en la parte superior y la base púrpura en la parte inferior.
- **ABRA EL INHALADOR:** abra el inhalador levantando la boquilla blanca a una posición vertical.
- **COLOQUE EL CARTUCHO:** sostenga el cartucho con la copa hacia abajo. El extremo puntiagudo del cartucho debe alinearse con el extremo puntiagudo del inhalador. Coloque el cartucho dentro del inhalador, asegurándose de que quede plano en el inhalador.
- **MANTÉNGALO NIVELADO:** ahora que el cartucho está cargado, mantenga el inhalador nivelado desde este punto en adelante para evitar la pérdida del medicamento en polvo. No lo voltee hacia abajo, no lo agite ni lo deje caer, ya que esto podría causar la pérdida del medicamento en polvo.
- **CIERRE EL INHALADOR:** baje la boquilla para cerrar el inhalador (esto abrirá el cartucho con medicamento). Debe sentir un chasquido cuando el inhalador se cierra.




CÓMO USAR AFREZZA®



PASO 3: INHALE LA INSULINA


- **RETIRE LA TAPA:** retire la tapa de la boquilla. Mantenga el inhalador nivelado.
- **EXHALE:** mantenga el inhalador alejado de la boca y exhale completamente.
- **COLOQUE EL INHALADOR EN POSICIÓN:** manteniendo la cabeza y el inhalador nivelados, coloque la boquilla en su boca. Cierre los labios alrededor de la boquilla para formar un sello. Incline el inhalador hacia abajo manteniendo la cabeza nivelada, como se muestra en la imagen.
- **INHALE PROFUNDAMENTE Y CONTENGA LA RESPIRACIÓN:** con la boca cerrada alrededor de la boquilla, inhale profundamente a través del inhalador. Contenga la respiración todo el tiempo que le resulte cómodo y, al mismo tiempo, retire el inhalador de su boca. Exhale y respire normalmente.



PASO 4: RETIRE EL CARTUCHO Y DESÉCHELO

- **TAPE DE NUEVO:** vuelva a colocar la tapa de la boquilla en el inhalador.
- **ABRA EL INHALADOR:** abra el inhalador levantando la boquilla blanca.
- **RETIRE EL CARTUCHO:** retire el cartucho de la base púrpura.
- **DESECHE:** deseche el cartucho en la basura doméstica habitual.

Repita los pasos 2 a 4 por cada cartucho de Afrezza que necesite para su dosis.





ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

CÓMO CUIDAR DE SU INHALADOR Y CARTUCHOS DE INSULINA AFREZZA

CUANDO ESTÁN EN USO: ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE

Consulte la tabla a continuación para obtener instrucciones sobre cómo cuidar de su inhalador y los paquetes de aluminio abiertos.

INHALADORES DE AFREZZA ABIERTOS	Temperatura ambiente
	Úselos hasta por 15 días a partir de la fecha del primer uso. Después de 15 días, el inhalador debe desecharse y reemplazarse.
TARJETAS BLÍSTER SELLADAS + TIRAS	Temperatura ambiente
	Deben ser utilizadas en un lapso de 10 días
TIRAS ABIERTAS	Temperatura ambiente
	Deben ser utilizadas en un lapso de 3 días

No coloque una tarjeta blíster o una tira de nuevo en el refrigerador después de haber estado almacenada a temperatura ambiente.

CUANDO NO ESTÁN EN USO: ALMACENAMIENTO REFRIGERADO

Almacene el medicamento sin abrir en un refrigerador a 36 °F-46 °F (2 °C-8 °C).

EMPAQUES DE ALUMINIO SELLADOS	Refrigerado
	Pueden ser utilizados hasta la fecha de expiración*
TARJETAS BLÍSTER SELLADAS + TIRAS	Refrigerado
	Deben ser utilizadas en un lapso de un mes*

*Si un paquete de aluminio, una tarjeta blíster o una tira no son refrigerados, el contenido debe usarse dentro de un plazo de 10 días.

ANTES DE USAR SU INHALADOR AFREZZA



Antes de usarlos, los cartuchos y el inhalador deben estar a temperatura ambiente durante 10 minutos.



TEMPERATURA AMBIENTE



10 min



PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿CUÁNDO DEBO TOMAR MI AFREZZA®?

R: Afrezza debe inhalarse al comienzo de las comidas.

P: ¿ES NORMAL VER RESTOS DE POLVO EN MI INHALADOR DESPUÉS DE INHALAR MI DOSIS DE AFREZZA?

R: Sí, es normal que quede una pequeña cantidad de polvo en la boquilla o en el cartucho. Esto no afecta su dosis. Puede limpiar la boquilla con un paño limpio y seco para eliminar la humedad o el lápiz labial. No lave el inhalador Afrezza.

P: ¿QUÉ DEBO HACER SI ME DA TOS?

R: Dado que Afrezza es un polvo inhalado, no es raro que le de tos al comienzo de su tratamiento. En nuestros estudios clínicos, la tos fue leve y, por lo general, disminuyó con el uso continuo después de 1 a 4 semanas. Como una sugerencia, tomar Afrezza a temperatura ambiente y tomar un sorbo de agua antes y después de la inhalación puede ayudar. Si desarrolla una tos persistente o recurrente, o tiene dificultades para respirar mientras usa Afrezza, comuníquese con su proveedor de atención médica.

¿PREGUNTAS ADICIONALES?

Ingrese a www.Afrezza.com o contacte a AfrezzaAssist® llamando al **1-844-323-7399**.

SU PRIMERA RECETA

Asegúrese de **descargar** la tarjeta de ahorros Afrezza® **antes de visitar su farmacia**, y es posible que deba darles al menos 48 horas para completar su pedido ya que algunos lugares podrían necesitar que se les envíe Afrezza.*

AfrezzaAssist®

Puede ayudarle a navegar por la cobertura del seguro y explicarle cómo usar su tarjeta de ahorros Afrezza.

SU PRIMERA DOSIS

Recuerde, Afrezza es diferente de la insulina inyectable ya que proporciona un control ultrarrápido que puede reducir los niveles de glucosa más rápido de lo que está acostumbrado.

AfrezzaAssist®

Puede ayudarle a comprender qué esperar durante las primeras semanas de tratamiento y brindarle instrucciones sobre la técnica de inhalación adecuada.

SU PRIMERA CITA DE SEGUIMIENTO

Una vez que usted y su médico han decidido que Afrezza es adecuada para usted, asegúrese de programar un seguimiento a las 2 semanas para analizar los resultados iniciales, y abordar cualquier problema o reacción adversa.

AfrezzaAssist®

Puede ayudarle a resolver cualquier pregunta que usted pueda tener para asegurarse de que aproveche al máximo su experiencia con Afrezza.

SU ÉXITO CONTINUADO

Su médico será su mejor recurso a medida que optimiza la dosificación y le encuentra solución a los efectos secundarios comunes, incluida la tos, que generalmente es leve y tiende a disminuir con el uso continuo.

AfrezzaAssist®

Brinda capacitación y apoyo según lo necesite, y le ayuda a identificar programas financieros adicionales para los que puede ser elegible y que pueden mantener su tratamiento asequible.

CONTÁCTENOS:



TELÉFONO (GRATUITO)

1-844-323-7399

HORARIO

Lunes - Viernes 8:00 a. m. - 8:00 p. m.
(hora del este)



SITIO WEB

www.Afrezza.com



¡Inscríbese hoy mismo
escaneando el código QR!

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre AFREZZA?

AFREZZA puede producir efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Problemas pulmonares repentinos (broncoespasmos).** No use AFREZZA si tiene problemas pulmonares de larga duración (crónicos), como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Antes de comenzar a usar AFREZZA, su proveedor de atención médica le hará una prueba de respiración para verificar cómo están funcionando sus pulmones.

¿Qué es AFREZZA?

- AFREZZA es una insulina humana que se aspira a través de los pulmones (inhalada) y se usa para controlar los niveles altos de azúcar en sangre en adultos con diabetes mellitus.
- AFREZZA no debe usarse en lugar de la insulina de acción prolongada. AFREZZA debe usarse con la insulina de acción prolongada en personas que tienen diabetes mellitus tipo 1.
- AFREZZA no se usa para tratar la cetoacidosis diabética.
- Se desconoce si AFREZZA es segura y eficaz para ser usada en personas que fuman. AFREZZA no se debe usar en personas que fuman o que han dejado de fumar recientemente (menos de 6 meses).
- Se desconoce si AFREZZA es segura y eficaz en niños menores de 18 años.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de usar AFREZZA?

Antes de usar AFREZZA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, lo que incluye si:

- Tiene problemas pulmonares como asma o EPOC.
- Tiene o ha tenido cáncer de pulmón.
- Está usando algún medicamento inhalado.
- Fuma o ha dejado de fumar recientemente.
- Tiene problemas en los riñones o el hígado.

- Está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. AFREZZA puede dañar a su bebé por nacer o al que está amamantando.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que utiliza, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Antes de comenzar a usar AFREZZA, hable con su proveedor de atención médica sobre los niveles bajos de azúcar en la sangre y cómo controlarlos.

¿Qué debo evitar mientras uso AFREZZA? Mientras use AFREZZA no debe:

- Conducir o manejar maquinaria pesada, hasta que sepa cómo le afecta AFREZZA.
- Beber alcohol o usar medicamentos de venta libre que contengan alcohol.
- Fumar.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de AFREZZA?

AFREZZA puede producir efectos secundarios graves que pueden provocar la muerte, incluyendo:

Vea "¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre AFREZZA?"

- **Nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia).** Los signos y síntomas que pueden indicar un nivel bajo de azúcar en la sangre incluyen los siguientes:
 - o mareos o desvanecimiento, sudoración, confusión, dolor de cabeza, visión borrosa, dificultad para hablar, temblores, ritmo cardíaco acelerado, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor, hambre.
- **Disminución de la función pulmonar.** Su proveedor de atención médica debe verificar cómo están funcionando sus pulmones antes de que comience a usar AFREZZA, 6 meses después de que comience a usarla y anualmente después de eso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

Cáncer de pulmón. En estudios de AFREZZA en personas con diabetes, el cáncer de pulmón ocurrió en algunas personas más que estaban tomando AFREZZA que en personas que estaban tomando otros medicamentos para la diabetes. Hubo muy pocos casos para saber si el cáncer de pulmón estaba relacionado con AFREZZA. Si tiene cáncer de pulmón, usted y su proveedor de atención médica deben decidir si debe usar AFREZZA.

Cetoacidosis diabética. Hable con su proveedor de atención médica si tiene una enfermedad. Es posible que sea necesario modificar su dosis de AFREZZA o la frecuencia con la que usted controla su azúcar en sangre.

Reacción alérgica grave (reacción en todo el cuerpo). Solicite atención médica de inmediato si tiene alguno de estos signos o síntomas de una reacción alérgica grave:

- Un sarpullido en todo el cuerpo, dificultad para respirar, latidos cardíacos acelerados o sudoración.

Nivel bajo de potasio en la sangre (hipopotasemia).

Insuficiencia cardíaca. Tomar ciertas píldoras para la diabetes llamadas tiazolidinedionas o "TZD" con AFREZZA puede causar insuficiencia cardíaca en algunas personas. Esto puede suceder incluso si usted nunca antes ha tenido insuficiencia cardíaca o problemas cardíacos.

Referencias

1. Afrezza (insulin human) Inhalation Powder Prescribing Information. MannKind Corporation.
2. Bode BW, McGill JB, Lorber DL, et al. Inhaled Technosphere insulin compared with injected prandial insulin in type 1 diabetes: a randomized 24-week trial (Insulina Technosphere inhalada comparada con la insulina prandial inyectada en la diabetes tipo 1: un ensayo aleatorizado de 24 semanas). *Diabetes Care*. 2015;38(12):2266- 2273.
3. Rosenstock J, Franco D, Korpachev V, et al. Inhaled Technosphere insulin versus inhaled Technosphere placebo in insulin-naive subjects with type 2 diabetes inadequately controlled on oral antidiabetes agent (Insulina Technosphere inhalada versus placebo Technosphere inhalado en sujetos con diabetes tipo 2 inadecuadamente controlada con un agente antidiabético oral y sin tratamiento previo con insulina). *Diabetes Care*. 2015;38(12):2274-2281.
4. Akturk HK, Snell-Bergeon JK, Rewers A, et al. Improved postprandial glucose with inhaled Technosphere insulin compared with insulin aspart in patients with type 1 diabetes on multiple daily injections: the STAT study. *Diabetes Technol Ther*. 2018;20(10):639-647.
5. Datos registrados. MannKind Corporation.
6. American Diabetes Association. Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes—2022. *Diabetes Care*. 2022; 43(suppl. 1):S66-S76.

Si ya tiene insuficiencia cardíaca, puede empeorar mientras toma TZD con AFREZZA. Su proveedor de atención médica debe vigilarlo de cerca mientras esté tomando TZD con AFREZZA. Informe a su proveedor de atención médica si tiene síntomas nuevos o que han empeorado de insuficiencia cardíaca, que incluyen:

- Dificultad para respirar, hinchazón de los tobillos o los pies, aumento repentino de peso.

Obtenga ayuda médica de emergencia si tiene:

- Dificultad para respirar, falta de aire, latidos cardíacos acelerados, hinchazón del rostro, la lengua o la garganta, sudoración, somnolencia extrema, mareos, confusión.

Los efectos secundarios más frecuentes de AFREZZA incluyen los siguientes:

- Nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia), tos, dolor de garganta.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de AFREZZA. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Consulte la Guía del medicamento y las Instrucciones de uso en la solapa.



AFREZZA y el logotipo de Afrezza son marcas registradas, y ambas pertenecen a MannKind Corporation.

AFREZZAASSIST y el logotipo de AfrezzaAssist son solicitudes de marca presentadas por © MannKind Corporation 2022. US-AFR-2072.